

Traitement d'endodontie

Risques reliés à l'accès

- Dommage à une restauration déjà présente en bouche. Lorsque le dentiste doit faire un traitement de canal sur une dent où repose une couronne ou une autre restauration, il est possible que la restauration (couronne) soit endommagée au point d'être remplacée, réparée ou recollée. Le crampon de la digue peut endommager la couronne et la finition gingivale de la dent sur laquelle il repose.
- Perforation lors de la préparation de la cavité d'accès. Il arrive, en fraisant pour trouver les orifices canaux, que la couronne soit perforée sur les côtés ou bien au niveau de la furcation, dans le plancher de la chambre pulpaire. Parfois, la dent doit être extraite.
- Fracture de la dent. La prudence est de mise car la dent peut céder sous les forces de la mastication, en cours de traitement.
- Canal non détecté. Involontaire, certains canaux peuvent être laissés sans nettoyage, désinfection, préparation mécanique et obturation. Ceci peut entraîner des complications post-opératoires pouvant se manifester à plus ou moins long terme (sensibilité, douleur ou infection). Si tel est le cas, il se peut alors que le dentiste vous recommande d'autres traitements pour remédier à la situation.

Risques reliés à l'instrumentation

- Perforation au niveau de la racine
- Bris d'instrument dans le canal
- Blocage du canal

Complications suite à l'obturation

- Sous-obturation : situation où l'obturation ne se rend pas à l'apex. Un retraitement endodontique peut alors être indiqué.
- Sur-obturation : situation où l'obturation canaux se trouve à l'extérieur du canal, en contact avec les tissus avoisinant la racine de la dent. La guérison peut alors être retardée et même amener des symptômes post-opératoires (infection). Si tel est le cas, il se peut que le dentiste vous recommande d'autres traitements pour remédier à la situation.

Autres complications

Réveil Post-opératoire

- Douleur : À la suite du rendez-vous pour un traitement de canal, un peu de douleur peut être ressentie en touchant à la dent : le dentiste prescrira des analgésiques et cette douleur s'estompera graduellement après 72 heures.
- Enflure : dans un cas de dent préalablement infectée, de l'enflure peut se manifester et celle-ci pourra se contrôler à partir de la prise d'un antibiotique approprié.

Suite à la persistance de l'infection

Les interventions possibles sont :

- Retraitement de canal
- Chirurgie apicale avec obturation rétrograde
- Extraction et remplacement prosthodontique de l'espace édenté

Consentement éclairé au traitement d'endodontie

J'ai bien compris la nature et les limites du traitement endodontique ainsi que les difficultés reliées à mon traitement. Je comprends que même si au départ le pronostic semble bon, il est toujours possible qu'il survienne des complications mentionnées précédemment. Je comprends aussi que je devrai éviter de surcharger la dent en traitement lors de la mastication et ainsi faire restaurer cette dent le plus tôt possible afin d'éviter qu'elle ne se fracture ou qu'elle devienne irrécupérable (couronne ou recouvrement des cuspidés).

Afin d'être assuré d'avoir une place réservée pour vous dans notre horaire, un dépôt de 100\$ est requis. Ce dépôt est non remboursable si vous manquez ou si vous déplacez votre rendez-vous moins de 72 heures avant la date réservée.

Signature du patient : _____

Remis le : ____/____/____

Signature du dentiste : _____

Remis le : ____/____/____

Signature du patient : _____

Révisé le : ____/____/____

Signature du dentiste : _____

Révisé le : ____/____/____

