

# FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À L'EXTRACTION DES DENTS DE SAGESSE

## *POURQUOI ENLÈVE-T-ON LES DENTS DE SAGESSE?*

- 1- Les régions où poussent les dents de sagesse sont souvent des sites fréquents pour le développement de kyste ou de tumeurs ;
- 2- Lorsque la dent de sagesse est semi incluse et partiellement recouverte de gencive, il est préférable de l'extraire afin de prévenir l'infection;
- 3- Dans certains cas de traitement d'orthodontie, il est recommandé d'extraire les dents de sagesse pour créer l'espace manquant;
- 4- Les dents de sagesse sont parfois inclinées et leur croissance peuvent nuire et endommager les dents adjacentes;
- 5- Quand les dents de sagesse se développent trop près des dents adjacentes, cela peut engendrer un manque d'os et de gencive dans cette région.

## *QUAND EST-IL PRÉFÉRABLE D'EXTRAIRE LES DENTS DE SAGESSE?*

Il est suggéré de le faire entre 16 et 21 ans. À cet âge, la formation de racines des dents de sagesse n'est généralement pas complétée et la densité de l'Os est moins grande, i.e., que l'os est généralement plus mou.

## *LES COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES*

La plupart des chirurgies faites sur les dents de sagesse s'exécutent avec succès et sans difficultés. Toutefois, les complications suivantes sont susceptibles de survenir après la chirurgie

- Hémorragie ou saignements prolongés;
- Mauvaise guérison;
- Mauvaise haleine et ecchymose
- Œdème (enflure)
- Douleur et infection post-opératoire;
- Perte de sensibilité permanente ou partielle de la langue, de la lèvre et du menton (cette perte de sensibilité survient dans 1 à 3% des cas et il est très rare qu'elle soit permanente)

## *CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ À L'EXTRACTION DE LA DENT DE SAGESSE*

J'ai compris la nécessité et les limites de l'extraction de dent de sagesse ainsi que les risques de complications attachés à ce type d'intervention. Je comprends que, suivant l'extraction, pourrait y avoir une période d'engourdissement de la mâchoire, de l'enflure, un saignement, une décoloration des tissus et un inconfort possible. Je comprends que la position des nerfs dans la région de la dent incluse ne pouvant être déterminée de manière exacte par la radiographie, une blessure au nerf peut être possible et peut résulter dans la perte de sensation au menton, aux lèvres, et à la langue pour une période de temps. On m'a expliqué qu'habituellement, l'engourdissement est temporaire mais qu'en de rares occasions, il peut être permanent. Le succès de l'opération dépend de ma coopération en respectant les rendez-vous prévus, en suivant les instructions d'hygiène buccale à domicile et les conseils diététiques, en prenant la médication prescrite et en rapportant au cabinet dentaire tout changement de mon état de santé dans les plus brefs délais.

Signature du patient : \_\_\_\_\_ remis le : \_\_\_\_\_

Signature du dentiste : \_\_\_\_\_ remis le : \_\_\_\_\_

Signature du patient : \_\_\_\_\_ révisé le : \_\_\_\_\_

Signature du dentiste : \_\_\_\_\_ révisé le : \_\_\_\_\_