

Nom: _____

Dossier _____

EXTRACTION DE DENTS

QUEL SONT LES RISQUES ET COMPLICATIONS ASSOCIÉS À L'EXTRACTION DE DENTS

1. Dommages aux structures nerveuses adjacentes

Le traumatisme d'un nerf sensitif, qu'il s'agisse du nerf dentaire inférieur ou du nerf lingual, peut conduire à la paresthésie qui est définie comme une perte de sensibilité au niveau du menton, de la lèvre ou de la langue pour une période de temps variable. Habituellement, l'engourdissement est temporaire mais, en de rares occasions, il peut être permanent.

2. Dommages au sinus maxillaire supérieur

Le sinus maxillaire est une cavité pneumatique située dans le maxillaire supérieur. Parfois le sinus est hyperpneumatisé, c'est-à-dire qu'il peut s'étendre autour des apex (bouts) des dents. Ainsi, lors d'une extraction il peut fracturer et créer une communication entre le sinus et la cavité buccale.

3. Dommages aux dents voisines

4. Risque de fracture radiculaire

5. Risque de fracture mandibulaire

6. Risque d'infection

Cela peut se développer à la suite de l'extraction. Dans certains cas, le fouillage d'aliments peut en être la cause.

7. Risque d'alvéolite

Il s'agit de la complication postopératoire. La plus fréquente qui se définit par la perte prématurée du caillot sanguin de l'alvéole causant une ostéonécrose superficielle de l'os alvéolaire. Cela peut se produire entre 3 à 5 jours suivant l'extraction et se manifeste par une douleur très aiguë pouvant irradier jusqu'au niveau de l'oreille et par une mauvaise haleine.

8. Autres inconvénients

- * Douleur et inconfort
- * Saignement (hémorragie)
- * Œdème (enflure * Trismus * Douleur myofacial
- * Trouble à l'articulation temporo-mandibulaire

Qu'en est-il de la période suivant la chirurgie?

Cette période peut amener une détérioration significative de la qualité de vie du patient surtout pour les cinq premiers jours. Par exemple, l'enflure affecte le confort, la fonction et l'esthétique. Cette période varie en fonction de la complexité de la chirurgie et aussi en fonction de la façon dont le patient se conforme aux conseils postopératoires, médicaments, etc. Une bonne préparation psychologique fait partie des conditions de succès.

Consentement éclairé à l'extraction de la dent de sagesse

J'ai compris la nécessité et les limites de l'extraction de dent de sagesse ainsi que les risques de complications attachés à ce type d'intervention. Je comprends que, suivant l'extraction, pourrait y avoir une période d'engourdissement de la mâchoire, de l'enflure, un saignement, une décoloration des tissus et un inconfort possible. Je comprends que la position des nerfs dans la région de la dent incluse ne pouvant être déterminée de manière exacte par la radiographie, une blessure au nerf peut être possible et peut résulter dans la perte de sensation au menton, aux lèvres, et à la langue pour une période de temps. On ma expliqué qu'habituellement, l'engourdissement est temporaire mais qu'en de rares occasions, il peut être permanent. Le succès de l'opération dépend de ma coopération en respectant les rendez-vous prévus, en suivant les instructions d'hygiène buccale à domicile et les conseils diététiques, en prenant la médication prescrite et en rapportant au cabinet dentaire tout changement de mon état de santé dans les plus brefs délais.

Signature du patient : _____

Remis le : ____/____/____

Signature du dentiste : _____

Remis le : ____/____/____

Signature du patient : _____

Révisé le : ____/____/____

Signature du dentiste : _____

Révisé le : ____/____/____