

Instructions postopératoires d'une ou de plusieurs greffes gingivales

- Votre prochain rendez-vous de contrôle aura lieu une (1) semaine après la chirurgie
- Ne pas utiliser de soie dentaire dans la région de la greffe pour les 4 prochaines semaines et/ou jusqu'à ce que l'on vous y autorise
- **ÉVITER LE SURMENAGE** ainsi que toute activité excessive (sport) pour les 48 prochaines heures suivant la chirurgie
- **48 heures** après la chirurgie, nettoyer délicatement le site opéré avec la chlorhexidine (rince-bouche prescrit). Vous pouvez vous brosser les dents avec délicatesse sans dentifrice partout, à l'exception du site de la greffe. Ne pas utiliser de brosse à dents électrique pour les 4 prochaines semaines
- Pour rincer la bouche, utiliser le rince-bouche prescrit. Advenant le cas où il ne vous reste plus de ce rince-bouche, utiliser un mélange de ½ c. à thé de sel dans un verre d'eau tiède. Ne pas utiliser de rince-bouche commercial. Attention, le rince-bouche prescrit tache alors bien vous brosser la langue
- Les points de suture sont non-résorbables. Les points de sutures attachés à votre gencive seront enlevés dans une (1) semaine (cette intervention se fait sans chirurgie, sans anesthésie et sans douleur)

Date

signature du patient

Date

signature du dentiste